



**P: ¿Quiénes se someten a abortos?**

**P: ¿Quiénes se someten a abortos?**

**R:** Recurren al aborto mujeres de todos los grupos raciales, étnicos, socioeconómicos y religiosos. La mayoría de los abortos se producen en mujeres de entre 20 y 24 años, de bajos ingresos, que tienen al menos un hijo, algún tipo de estudios universitarios y profesan una religión.

Guttmacher Institute, Fact Sheet on Induced Abortion  
[http://www.guttmacher.org/pubs/fb\\_induced\\_abortion.html](http://www.guttmacher.org/pubs/fb_induced_abortion.html)



**P: ¿El aborto es seguro?**

**P: ¿El aborto es seguro?**

**R:** El aborto es un procedimiento extremadamente seguro cuando se practica en condiciones médicas adecuadas. Menos del 1% de todas las pacientes de abortos en EE. UU. sufren complicaciones graves.

Guttmacher Institute, Fact Sheet on Induced Abortion  
[http://www.guttmacher.org/pubs/fb\\_induced\\_abortion.html](http://www.guttmacher.org/pubs/fb_induced_abortion.html)



**P: ¿Quiénes brindan servicios de aborto?**



3

**P: ¿Quiénes brindan servicios de aborto?**

**R:** La mayoría de los abortos se practican en clínicas que se especializan en servicios de aborto y salud reproductiva. Los abortos también se brindan en consultorios particulares de médicos, hospitales y clínicas no especializadas (de atención primaria). Médicos, enfermeras, obstetras y personal auxiliar médico participan en los servicios de aborto.

Jones RK y Jerman J, Abortion incidence and service availability in the United States, 2011, *Perspectives on Sexual and Reproductive Health*, 2014, doi:10.1363/46e0414.

3



**P: ¿Dónde se pueden obtener servicios de aborto?**



4

**P: ¿Dónde se pueden obtener servicios de aborto?**

**R:** El aborto se puede obtener legalmente en los 50 estados, pero en muchos de ellos solamente hay un solo prestador conocido, y el 89% de los condados no cuentan con prestadores de servicios de aborto. Una de cada tres mujeres vive en un condado donde no hay prestadores de servicios de aborto.

*Roe v. Wade*, 410 U.S. 113 (1973)  
Jones RK and Jerman J, Abortion incidence and service availability in the United States, 2011, *Perspectives on Sexual and Reproductive Health*, 2014, doi:10.1363/46e0414.

4



**P: ¿Cuánto cuesta un aborto?**

**P: ¿Cuánto cuesta un aborto?**

**R:** Según donde se practique, un aborto durante el primer trimestre de embarazo cuesta habitualmente entre \$350 y \$500. El costo aumenta a medida que avanza el embarazo: a las 16 semanas cuesta normalmente \$700, y a las 20 semanas puede costar \$1.000 o más.

National Abortion Federation, Economics of Abortion,  
[https://www.prochoice.org/about\\_abortion/facts/economics.html](https://www.prochoice.org/about_abortion/facts/economics.html)



**P: ¿Qué es el aborto con medicamentos?**

**P: ¿Qué es el aborto con medicamentos?**

**R:** El aborto con medicamentos requiere la administración de fármacos para interrumpir el embarazo. Normalmente, se utilizan dos fármacos: mifepristona y misoprostol. El aborto con medicamentos en general es una alternativa viable únicamente en las primeras 9 semanas del embarazo.

Reproductive Health Access Project, Early Abortion Options,  
[http://www.reproductiveaccess.org/fact\\_sheets/downloads/early\\_abortion\\_options.pdf](http://www.reproductiveaccess.org/fact_sheets/downloads/early_abortion_options.pdf)




**P: ¿Qué es la anticoncepción de emergencia?**

**P: ¿Qué es la anticoncepción de emergencia?**

**R:** La anticoncepción de emergencia (o pastilla del día después) evita el embarazo al retardar la ovulación. La anticoncepción de emergencia se puede usar hasta 5 días después de haber mantenido relaciones sexuales sin protección, y se vende libremente sin receta.

Reproductive Health Access Project,  
Emergency Contraception and Medication Abortion: What's the Difference?  
[http://www.reproductiveaccess.org/fact\\_sheets/downloads/Difference.pdf](http://www.reproductiveaccess.org/fact_sheets/downloads/Difference.pdf)  
Planned Parenthood, The Morning After Pill,

<http://www.plannedparenthood.org/health-topics/emergency-contraception-morning-after-pill-4363.asp>



**P: ¿Cuántas mujeres han utilizado anticoncepción de emergencia?**

**P: ¿Cuántas mujeres han utilizado anticoncepción de emergencia?**

**R:** Una de cada 9 mujeres en edad reproductiva ha utilizado anticoncepción de emergencia.

Guttmacher Institute, Contraceptive Use in the United States,  
[www.guttmacher.org/pubs/fb\\_contr\\_use.html](http://www.guttmacher.org/pubs/fb_contr_use.html)



**P: ¿Por qué las mujeres se someten a abortos?**

**P: ¿Por qué las mujeres se someten a abortos?**

**R:** Los motivos más comunes que expresan las mujeres de EE. UU. para someterse a abortos son la necesidad de cuidar a otros hijos anteriores, el costo económico de tener un hijo, compromisos laborales o educativos, y dudas sobre su vínculo o temor a convertirse en madres solteras.

Finer LB *et al.*, Reasons U.S. women have abortions: quantitative and qualitative perspectives, *Perspectives on Sexual and Reproductive Health*, 2005, 37(3):110-118.



**P: ¿Por qué las mujeres recurren a abortos en etapas más avanzadas del embarazo?**

**P: ¿Por qué las mujeres recurren a abortos en etapas más avanzadas del embarazo?**

**R:** Casi el 92% de los abortos se producen en las 12 primeras semanas del embarazo. Las mujeres recurren a abortos en etapas más avanzadas cuando, por ejemplo, se enteran tardíamente de que están embarazadas, cambian sus circunstancias personales, se detectan anomalías en el feto o sufren demoras en el acceso a prestadores de servicios adecuados.

Pazol, K, *et al.*, Abortion Surveillance — United States, 2010, Morbidity and Mortality Weekly Report, 29 de noviembre de 2013, 2(ss08);1-44  
University of California, San Francisco, ANSIRH,  
<http://www.ansirh.org/research/late-abortion/facts.php>



**P: ¿Cuál es el porcentaje de embarazos no planeados en EE. UU.?**

**P: ¿Cuál es el porcentaje de embarazos no planeados en EE. UU.?**

**R:** Casi la mitad (el 49 %) de todos los embarazos en EE. UU. son no planeados.

Finer LB y Zolna MR, Shifts in intended and unintended pregnancies in the United States, 2001-2008, *American Journal of Public Health*, 2013, doi: 10.2105/AJPH.2013.301416.



**P: ¿Quiénes tienen embarazos no planeados?**

**P: ¿Quiénes tienen embarazos no planeados?**

**R:** A los 45 años, más de la mitad de las mujeres estadounidenses han tenido un embarazo no planeado. Los índices de embarazos no planeados son más elevados entre mujeres de sectores pobres y de bajos ingresos, mujeres de entre 18 y 24 años, mujeres que conviven con una pareja y mujeres de grupos minoritarios. Entre los distintos estados, los índices más altos de embarazos no planeados en general se registran en la región sur y sudoeste.

Guttmacher Institute, Fact Sheet: Unintended Pregnancy in the United States  
<http://www.guttmacher.org/pubs/FB-Unintended-Pregnancy-US.html>



**P: ¿Cuántos embarazos se interrumpen debido a abortos espontáneos ?**

**P: ¿Cuántos embarazos se interrumpen debido a abortos espontáneos ?**

**R:** Aproximadamente 1 de cada 6 embarazos comprobados se interrumpen debido a abortos espontáneos.

American Pregnancy Association, Miscarriage,  
<http://americanpregnancy.org/pregnancycomplications/miscarriage.html>



**P: ¿Qué cantidad de mujeres utilizan métodos anticonceptivos?**

**P: ¿Qué cantidad de mujeres utilizan métodos anticonceptivos?**

**R:** El 89 por ciento de las mujeres expuestas a embarazos no planeados utilizan actualmente métodos anticonceptivos.

Jones J, Mosher WD & Daniels K, Current contraceptive use in the United States, 2006 -2010, and changes in patterns of use since 1995, *National Health Statistics Reports*, 2012, No. 60, [www.cdc.gov/nchs/data/nhsr/nhsr060.pdf](http://www.cdc.gov/nchs/data/nhsr/nhsr060.pdf)



**P: ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos más utilizados?**

**P: ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos más utilizados?**

**R:** Las pastillas anticonceptivas y la esterilización femenina han sido los métodos más utilizados desde 1982.

Guttmacher Institute, Contraceptive Use in the United States,  
[www.guttmacher.org/pubs/fb\\_contr\\_use.html](http://www.guttmacher.org/pubs/fb_contr_use.html)



**P: ¿Qué cantidad de niños son dados en adopción?**

**P: ¿Qué cantidad de niños son dados en adopción?**

**R:** Aproximadamente 18.000 niños nacidos en EE. UU. son dados en adopción cada año.

National Council for Adoption, *Adoption Advocate*  
Policy Priorities and Adoption-Related Legislation, No. 43: 2012  
[www.adoptioncouncil.org/publications/adoption-advocate-no-43.html](http://www.adoptioncouncil.org/publications/adoption-advocate-no-43.html)





**P: ¿Es común que las personas en EE. UU. mantengan relaciones sexuales antes del matrimonio?**

**P: ¿Es común que las personas en EE. UU. mantengan relaciones sexuales antes del matrimonio?**

**R:** El 95% de los estadounidenses mantienen relaciones sexuales antes de contraer matrimonio. Esto ha sido así desde hace décadas: incluso entre las mujeres que nacieron en la década de 1940, casi 9 de cada 10 mantuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio.

Finer LB., Trends in premarital sex in the United States, 1954-2003, Public Health Rep. Enero-febrero de 2007;122(1):73-8.



**P: ¿Cuántos embarazos se producen cada año en EE. UU.?**

**P: ¿Cuántos embarazos se producen cada año en EE. UU.?**

**R:** Cada año se producen en EE. UU. aproximadamente 6,6 millones de embarazos.

Guttmacher Institute, Fact Sheet: Unintended Pregnancy in the United States <http://www.guttmacher.org/pubs/FB-Unintended-Pregnancy-US.html>



**P: ¿Es común el embarazo ectópico?**



**P: ¿Es común el embarazo ectópico?**

**R:** El embarazo ectópico ocurre cuando el óvulo fecundado se implanta fuera del útero, y se produce en hasta 1 de cada 50 embarazos.

March of Dimes, Pregnancy Loss  
<http://www.marchofdimes.com/loss/ectopic-and-molar-pregnancy.aspx>



**P: ¿Qué porcentaje de nacimientos se producen por cesárea?**



**P: ¿Qué porcentaje de nacimientos se producen por cesárea?**

**R:** En EE. UU., 1 de cada 3 nacimientos se produce por cesárea.

Center for Disease Control, FastStats: Births — Method of Delivery,  
<http://www.cdc.gov/nchs/fastats/delivery.htm>



**P: ¿Es común la depresión posparto?**

**P: ¿Es común la depresión posparto?**

**R:** Entre el 8 % y el 19 % de las mujeres afirman sufrir depresión posparto.

Center for Disease Control, Depression among Women of Reproductive Age  
<http://www.cdc.gov/reproductivehealth/Depression/>



